

Forældrevejledninger

Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Herning, Randers, Skejby og Viborg børneafdelinger.

Hensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet vejledning til forældre på tværs af følgende sektorer: Sundhedsplejersker, praktiserende læger, vagtlæger og personalet på børnemodtagelserne i Region Midtjylland.

Vejledningerne kan ses og hentes fra internettet på hjemmesiden <http://www.rm.dk/sundhed/børn+og+unge/forældrevejledninger>

Yderligere pjecer kan bestilles hos Rikke Dalsgaard, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland, Skottenborg 28, 8800 Viborg. rikke.dalsgaard@stab.rm.dk

Maj 2010



Grafisk Service, 2900-09-271-01B

Regionalt Sundhedssamarbejde
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
www.regionmidtjylland.dk

BØRN MED

3 dages feber



Regionshuset
Viborg
Regionalt Sundhedssamarbejde

Børn med 3 dages feber

Generelt:

3 dages feber er en virussygdom, der giver høj feber i tre dage, og så falder temperaturen. I forbindelse med at temperaturen falder, kommer der et rødpletet udslæt på huden. Det starter typisk på kroppen og spreder sig til arme og ben.

Sygdommen skyldes et almindelig virus, og derfor får de fleste børn sygdommen som spæde eller som små børn.

Smitte:

Årsagen til sygdommen er virus, som overføres via luftvejene ved dråbeinfektion blandt andet host og nys.

Virusset findes i barnets spyt, og smitten sker, når barnet indånder små dråber fra host eller nys, og når det har kontakt med urene hænder eller f.eks. legetøj med spyt eller snot. Der går 5 – 15 dage, fra barnet er smittet, til det bliver sygt.

Symptomer:

- Pludselig høj feber hos et barn, der ikke har tegn på forkølelse.
- Træthed, uro og almen utilpashed.
- Feberen forsvinder som regel efter tre dage, deraf navnet.
- Der kommer udslæt på huden, når temperaturen er faldet.



Gode råd:

- Når barnet har feber, er det vigtigt, at det kan komme af med varmen. Tit er det nok, at barnet har undertøj og små sokker på. Læg et lagen eller dynebetræk over i stedet for dynen.
- Barnet skal have rigeligt at drikke. Tilbyd små mængder hyppigt. Spædbørn bør ammes ekstra.

Hvornår søger man læge:

Søg læge hvis barnet:

- virker slapt, og du har dårlig kontakt med det
- ikke vil drikke og ikke kan tisse
- har høj feber mere end tre dage
- får udslæt, der ikke forsvinder, når du trykker på det
- bekymrer dig og du bliver utryg.

Brug først og fremmest din egen læge, som kender barnet bedre end vagtlægen. Sundhedsplejersken kan også komme med vejledning og gode råd.

Behandling:

Ved de fleste virussygdomme er der ingen effektiv behandling. Det drejer sig om at lindre symptomerne og holde øje med barnets tilstand. Hvis barnet har smerter og/eller ikke vil drikke, kan du give smertestillende medicin efter aftale med en læge.

Forebyggelse:

Forebyggelse er vanskelig i praksis, fordi smitten nemt overføres, de steder hvor mange børn er i tæt kontakt med hinanden. Håndvask efter at have rørt ved et sygt barn er vigtig. Generelt er det vigtigt, at både børn og voksne vasker hænder tit, da undersøgelser viser, at det betyder mindre smitte af sygdomme.

Institution/dagpleje:

Barnet må komme i institution, når det ikke har feber længere og har det godt. Er der mulighed for, at barnet kan blive hjemme et par dage ekstra, er det fint, for det første par dage, har barnet større risiko for at blive smittet med andre sygdomme. Det gør også risikoen for at smitte andre børn mindre.