

BØRN MED

skoldkopper



Børn med skoldkopper



Generelt:

Skoldkopper er en almindelig børnesygdom, som skyldes et virus. Sygdommen er hyppigst hos børn i 5 – 9 års alderen, men den kan forekomme i alle aldre såvel fra nyfødt som voksen.

Sygdommen giver et udslæt med blærer og kløer ofte. Den bryder ud fra 7 – 28 dage efter man er smittet. En person smitter fra ca. 3 dage før udslættet bryder ud, til der er dannet tørre skorper på alle blærerne. Man bliver livsvarigt immun, og man kan derfor ikke få skoldkopper igen.

Smitte:

Smitten sker fra person til person og kan enten ske ved direkte kontakt med bristede blærer, eller ved at man indånder små dråber fra host eller nys fra en smittet.

Symptomer:

- Eventuel feber og utilpashed før udslættet bryder ud.
- Udslæt, der som regel begynder i ansigtet og på kroppen, men som kan sprede sig til hovedbund, arme og ben. Kan også sprede sig til slimhinderne især i munden og på kønsorganerne.
- I starten kommer der små røde pletter, der i løbet af nogle timer bliver til blærer, som hurtigt brister og dækkes af skorper. Det kan

tage fra få dage til et par uger, før skorperne falder af.

- Der kan komme nye blærer i 3 – 6 dage, og det er meget forskelligt fra person til person, hvor mange blærer, der kommer.
- Udslættet klør ofte.
- Der kan være feber, men børn er ofte ikke meget medtagede af sygdommen.
- Der kan være små ar, når skorperne falder af.

Gode råd:

- Man kan duppe huden med zinklinement, det køler og hjælper mod kløen.
- Man skal undgå, at barnet kradsler i sårene, for det kan medføre betændelse.
- Hold barnets negle korte og vær omhyggelig med hygiejnen (barnet må gerne komme i bad).
- Giv ikke barnet for meget tøj på, og hold rummet køligt.

Hvornår søger man læge?

Søg læge hvis barnet:

- får betændelse i skoldkopperne
- får andet udslæt
- ikke drikker og tisser
- bliver slapt eller sløvt
- bekymrer dig, og du bliver utryg.

Brug først og fremmest din egen læge, som kender barnet bedre end vagtlægen. Sundhedsplejersken kan også give vejledning og gode råd.

Behandling:

Behandling er hovedsagelig lindring af symptomerne.

- Kløestillende creme/zinklinement, der duppes på huden.
- Antibiotika – salve, piller eller mikstur, hvis der kommer betændelse i sårene.

Institution/dagpleje:

Barnet må komme i institution/ dagpleje, når der ikke er kommet nye blærer i 2 dage og blærerne er tørret ind - og barnet i øvrigt har det godt.

Forældrevejledningerne

Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Herning, Randers, Skejby og Viborg børneafdelinger.

Hensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet vejledning til forældre på tværs af følgende sektorer: Sundhedsplejersker, praktiserende læger, vagtlæger og personalet på børnemodtagelserne i Region Midtjylland.

Vejledningerne kan ses og hentes fra internettet på hjemmesiden www.fv.rm.dk

Yderligere pjecer kan bestilles hos Rikke Dalsgaard, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, Skottenborg 28, 8800 Viborg. rikke.dalsgaard@stab.rm.dk

Juni 2018

