

Notat vedrørende redderkompetencer i Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.



Regionsmedlem Anne V. Kristensen har 7/4 2010 anmodet om en redegørelse for:

Dato 21-04-2010

Helge Præstgaard Carlsen

Tel. 87284469

Helge.Carlsen@ph.rm.dk

Side 1

I. Hvad Region Midtjyllands ambulanceredderne må i forhold til deres uddannelsesniveau og ambulanceredderne i de øvrige 4 regioner, herunder en beskrivelse af de nuværende retningslinjer og deres afgrænsning. Der er herunder anmodet om at få belyst følgende 5 punkter:

"1. De må gerne lægge en kanyle i venen på en patient, men de må ikke give patienten medicin i kanylen. Ved f.eks. lavt blodsukker, vil patienten få det bedre meget hurtigere ved medicin givet i venen, frem for medicin givet i musklen.

2. De har medicin i tasken, som de ikke må bruge uden at spørge en læge først.

Jeg var med ved et hjertestop. Midt i genoplivning skal redderen ringe til en læge og få tilladelse til at give adrenalin. Det må stadig kun gives i musklen trods det at virkningen er bedre ved at give det i venen. De mangler andre former for medicin som kan gives ved hjertestop f.eks. atropin.

3. De må ikke smertedække en patient i ambulancen – trods det at de har modgift, som kan ophæve bivirkninger om nødvendigt. Samme modgift som bruges til narkomaner der har taget en overdosis og den må de gerne give.

Patienter skal altså lide unødigt.

4. Paramedicinere i Region Midtjylland, vil gerne intubere, men må ikke gøre det. I Nordjylland må de gerne.

En person med hjertestop behandles optimalt hvis der er sket intubation, idet det kunstige åndedræt er mest effektivt derved.

5. Redderne må ikke -som i andre regioner, starte medicinsk blodfortyndende behandling ved stor blodprop i hjertet, men skal køre til nærmeste akutmodtagelse eller afvente akutlæge for at patienten kan få behandlingen. Herefter transporteres patienten så videre til Skejby. Hvis redderne kan indlede denne behandling kan

patienten transporteres direkte til ballon behandling i Skejby og tid spares og liv reddes”

II. Redegørelse for projektplan i delområde Horsens samt baggrunden for, at der ikke startes forsøg.

Præhospitalet havde fået en frist til besvarelse på 7 dage og det var ikke været muligt i tide at indhente det nødvendige materiale fra de andre regioner. I Notat vedrørende redderkompetencer i Region Midtjylland af 14/4 2010 er forespørgslens punkt I således besvaret uden at medtage oplysninger om de øvrige regioner. Punkt II er besvaret. Nedenfor følger 1) Ambulanceredderens kompetencer i forhold til deres uddannelsesniveau i de 4 øvrige regioner. for overskuelighedens skyld er reddernes kompetencer i Region Midtjylland medtaget.

1) Ambulanceredderens kompetencer i forhold til deres uddannelsesniveau i de 4 øvrige regioner.

Region	Ambulancebehandler	Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)
Midtjylland	Følger bekendtgørelsen. Ambulancebehandlere har kompetence til at give medicin i blodåren, når de er uddannet til lægeassistenter og kører på akutlægebil.	Følger bekendtgørelsen.
Nordjylland	Følger bekendtgørelsen. Enkelte ambulancebebehandlere, der arbejder alene på akutbiler i yderområder (Hals og Skagen), har kompetence til at smertebehandle med morfinlignende stoffer i blodåren.	Følger bekendtgørelsen. Mulighed for at give medicin direkte i knogle hvis der efter 2 forsøg ikke kan anlægges kanyle. 2-årigt projekt, hvor paramedicinerne må intubere ved hjertestop. Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet.
Syddanmark	Følger bekendtgørelsen. Enkelte behandlere på akutlægebiler (lægeassistenter) har kompetence til at smertebehandle med morfinlignende stoffer i blodåren. De bærer kompetencen med sig, når de kører almindelig ambulance.	Følger bekendtgørelsen. Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet.

	Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet.	
Sjælland	Følger bekendtgørelsen. Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet efter telefonisk konsultation med ambulancelæge. Dog kun i Region Sjællands område 5 og 6 ¹ .	Følger bekendtgørelsen. Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet. Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet. I område 5 og 6 (se fodnote 1): Mulighed for at give medicin direkte i knogle og anlægge larynxmaske ² .
Hovedstaden	Følger bekendtgørelsen.	Følger bekendtgørelsen. Desuden blodfortyndende behandling i åren ved stor blodprop i hjertet. Kan anlægge larynxmaske.

¹ Område 5: Fakse, Stevns og Næstved kommuner, område 6: Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner

² En larynxmaske bruges til sikring af frie luftveje. Larynxmasken føres gennem munden ned i svælget, indtil masken dækker indgangen til struben. Der er således ikke tale om intubation.