

Tillæg til Kronikerkompassets kvantitative evaluering

-Subanalyser for KOL-forløbsprogrammet

Der er marts 2013 udført supplerende analyser til den Kvantitative Evaluering af Kronikerkompasset med henblik på at tage højde for, hvilket forløbsprogram, deltagerne i Kronikerkompasset arbejdede med.

Denne uddybning/allonge er udført for følgende to scenarier:

- Sammenligning mellem de deltagende praksis, der har arbejdet med KOL (**KOL fokus**) og deltagende praksis, der ikke har arbejdet med KOL (**Ikke-KOL fokus**).
- Sammenligning mellem de deltagende praksis, der har arbejdet med KOL (**KOL fokus**) og ikke deltagende praksis (**Ikke deltagere**).

A: TABELLER

KOL fokus (deltagere) vs. Ikke-KOL fokus (deltagere)

Kronikeromsorg for KOL (undersøgelser)

Lungefunktionsundersøgelse årligt (15 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	21.4	27.9	33.6	6.5 (4.3;8.8)	5.6 (3.6;7.7)	-0.9 (-4.6;2.8)
KOL fokus	21.5	26.4	39.6	4.9 (3.2;6.6)	13.2 (11.2;15.1)	8.3 (5.4;11.2)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	0.1 (-2.7;2.9)	-1.6 (-4.8;1.7)	6.0 (2.7;9.3)	-1.7 (-4.5;1.1)	7.5 (4.7;10.4)	9.2 (4.5;13.9)

Influenzavaccination årligt (15 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	42.8	47.3	47.0	4.5 (3.4;5.6)	-0.2 (-1.1;0.7)	-4.7 (-6.4;-3.0)
KOL fokus	42.6	46.9	46.1	4.3 (3.4;5.3)	-0.8 (-1.7;0.1)	-5.1 (-6.6;-3.6)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-0.2 (-1.8;1.4)	-0.4 (-2.0;1.2)	-0.9 (-2.5;0.7)	-0.2 (-1.6;1.3)	-0.5 (-1.8;0.7)	-0.4 (-2.6;1.9)

Behandling af KOL (indløste recepter)

Prednisolonmængde ≥ 250 mg årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	13.8	14.5	15.7	0.6 (-0.3;1.6)	1.2 (0.5;2.0)	0.6 (-0.8;2.0)
KOL fokus	14.6	15.1	15.8	0.5 (-0.2;1.2)	0.7 (-0.0;1.4)	0.2 (-1.0;1.4)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	0.8 (-0.7;2.3)	0.7 (-0.7;2.1)	0.1 (-1.3;1.6)	-0.1 (-1.3;1.0)	-0.5 (-1.6;0.5)	-0.4 (-2.3;1.5)

Beta2-agonister [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	56.2	54.9	55.6	-1.3 (-2.8;0.3)	0.7 (-0.6;1.9)	1.9 (-0.2;4.0)
KOL fokus	56.0	54.0	54.4	-2.0 (-3.2;-0.8)	0.3 (-0.6;1.3)	2.3 (0.8;3.9)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-0.2 (-2.6;2.3)	-0.9 (-2.8;1.0)	-1.2 (-3.1;0.7)	-0.7 (-2.7;1.2)	-0.3 (-1.9;1.2)	0.4 (-2.2;3.0)

Anticholinergika [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	19.6	22.8	26.2	3.3 (2.1;4.5)	3.4 (2.6;4.2)	0.1 (-1.4;1.7)
KOL fokus	19.9	23.3	26.8	3.4 (2.5;4.3)	3.5 (2.7;4.3)	0.1 (-1.1;1.3)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	0.3 (-1.5;2.1)	0.4 (-1.3;2.1)	0.5 (-1.4;2.4)	0.1 (-1.4;1.6)	0.1 (-1.0;1.3)	-0.0 (-2.0;1.9)

Methylxantiner [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	3.1	1.9	1.3	-1.2 (-1.4;-0.9)	-0.7 (-0.9;-0.5)	0.5 (0.1;0.9)
KOL fokus	2.7	1.9	1.3	-0.8 (-1.0;-0.6)	-0.5 (-0.7;-0.4)	0.3 (-0.0;0.5)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-0.4 (-1.0;0.1)	-0.1 (-0.5;0.4)	0.1 (-0.2;0.4)	0.4 (0.0;0.7)	0.1 (-0.1;0.4)	-0.2 (-0.7;0.2)

Inhalerede Glukokortikoider [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	38.7	33.1	30.0	-5.6 (-7.0;-4.2)	-3.1 (-4.2;-2.0)	2.5 (0.7;4.3)
KOL fokus	39.6	34.7	30.9	-4.9 (-5.9;-4.0)	-3.7 (-4.7;-2.8)	1.2 (-0.2;2.6)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	0.9 (-2.5;4.2)	1.6 (-1.2;4.3)	0.9 (-1.3;3.1)	0.7 (-1.0;2.4)	-0.7 (-2.1;0.8)	-1.4 (-3.6;0.9)

Kombinationspræparater [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	47.1	49.3	49.6	2.3 (0.8;3.8)	0.2 (-0.8;1.2)	-2.1 (-4.1;-0.0)
KOL fokus	45.4	48.2	48.0	2.8 (1.6;4.1)	-0.2 (-1.1;0.7)	-3.0 (-4.5;-1.5)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-1.6 (-4.6;1.3)	-1.1 (-3.8;1.5)	-1.6 (-3.9;0.8)	0.5 (-1.5;2.5)	-0.4 (-1.8;0.9)	-0.9 (-3.5;1.6)

Lægekontakter almen praksis KOL

Årskontrol årligt (15 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	8.2	15.0	31.5	6.8 (5.1;8.5)	16.5 (13.9;19.2)	9.8 (6.5;13.0)
KOL fokus	9.2	15.8	33.7	6.7 (5.1;8.2)	17.9 (16.0;19.7)	11.2 (8.9;13.5)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	0.9 (-1.2;3.1)	0.8 (-2.3;4.0)	2.1 (-2.3;6.6)	-0.1 (-2.4;2.2)	1.3 (-1.9;4.5)	1.4 (-2.6;5.4)

Middelantal vagtlægekontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	389.3	352.5	246.6	-36.8 (-65.2;-8.4)	-105.9 (-131.1;-80.7)	-69.1 (-114.0;-24.2)
KOL fokus	384.1	364.8	257.8	-19.3 (-42.0;3.4)	-107.1 (-129.7;-84.4)	-87.8 (-122.8;-52.7)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-5.1 (-46.4;36.2)	12.4 (-23.0;47.7)	11.2 (-14.4;36.7)	17.5 (-18.9;53.9)	-1.2 (-35.0;32.7)	-18.7 (-75.7;38.3)

Middelantal face-to-face-kontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	7400.3	7681.6	8141.7	281.2 (85.4;477.1)	460.1 (274.9;645.4)	178.9 (-124.1;481.9)
KOL fokus	7142.9	7661.7	7991.5	518.8 (344.4;693.2)	329.9 (166.8;493.0)	-188.9 (-446.4;68.6)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-257.5 (-612.2;97.3)	-19.9 (-400.0;360.2)	-150.1 (-506.2;206.0)	237.6 (-24.3;499.4)	-130.2 (-377.0;116.6)	-367.8 (-765.6;30.0)

Lægekontakter sekundærsektor KOL

Indlæggelse årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	22.2	22.3	22.0	0.2 (-1.0;1.4)	-0.3 (-1.3;0.7)	-0.5 (-2.5;1.5)
KOL fokus	22.1	22.3	22.1	0.2 (-0.6;1.0)	-0.3 (-1.2;0.7)	-0.5 (-2.0;1.0)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-0.0 (-1.4;1.4)	0.0 (-1.3;1.3)	0.0 (-1.0;1.1)	0.0 (-1.4;1.5)	0.0 (-1.4;1.5)	0.0 (-2.5;2.5)

Indlæggelse for KOL årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	3.1	2.8	3.0	-0.3 (-0.8;0.1)	0.2 (-0.1;0.6)	0.6 (-0.1;1.2)
KOL fokus	3.1	2.9	2.8	-0.2 (-0.5;0.2)	-0.1 (-0.4;0.2)	0.1 (-0.4;0.7)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-0.1 (-0.6;0.4)	0.1 (-0.3;0.5)	-0.2 (-0.7;0.3)	0.2 (-0.4;0.7)	-0.3 (-0.8;0.2)	-0.5 (-1.3;0.4)

Indlæggelse (respiratorisk) årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	6.6	5.7	5.8	-0.9 (-1.6;-0.2)	0.1 (-0.5;0.6)	0.9 (-0.1;2.0)
KOL fokus	6.4	6.2	6.2	-0.2 (-0.7;0.3)	0.0 (-0.4;0.5)	0.2 (-0.5;1.0)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	-0.2 (-0.9;0.5)	0.5 (-0.2;1.1)	0.5 (-0.1;1.1)	0.7 (-0.1;1.5)	-0.0 (-0.8;0.7)	-0.7 (-2.0;0.6)

Middelantal ambulante kontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	3271.1	3644.2	3960.4	373.1 (233.3;512.9)	316.2 (139.9;492.4)	-56.9 (-329.7;215.9)
KOL fokus	3282.6	3746.9	4022.1	464.3 (325.7;602.9)	275.2 (128.4;422.0)	-189.1 (-433.4;55.1)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	11.5 (-209.2;232.3)	102.7 (-148.3;353.7)	61.7 (-193.9;317.4)	91.2 (-105.7;288.2)	-41.0 (-270.5;188.5)	-132.2 (-498.4;233.9)

Middelantal ambulante KOL-kontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-KOL fokus	168.6	173.8	220.4	5.2 (-20.6;30.9)	46.7 (20.4;72.9)	41.5 (-2.2;85.2)
KOL fokus	186.1	198.4	237.8	12.3 (-22.2;46.9)	39.4 (10.9;67.9)	27.0 (-26.2;80.3)
KOL fokus vs. Ikke-KOL fokus	17.4 (-21.6;56.5)	24.6 (-6.6;55.8)	17.3 (-18.7;53.3)	7.2 (-35.8;50.2)	-7.3 (-46.0;31.5)	-14.5 (-83.3;54.4)

KOL fokus (deltagere) vs. Ikke-deltagere

Kronikeromsorg for KOL (undersøgelser)

Lungefunktionsundersøgelse årligt (15 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	17.5	19.7	25.2	2.3 (0.6;4.0)	5.5 (3.4;7.5)	3.2 (0.3;6.1)
KOL fokus	21.4	26.3	39.5	4.9 (3.2;6.6)	13.2 (11.2;15.2)	8.3 (5.4;11.2)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	4.0 (0.9;7.0)	6.6 (3.4;9.8)	14.3 (10.7;17.9)	2.6 (0.2;5.0)	7.7 (4.9;10.6)	5.1 (1.0;9.2)

Influenzavaccination årligt (15 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	43.5	47.8	45.7	4.3 (3.2;5.3)	-2.1 (-3.3;-0.8)	-6.3 (-8.3;-4.4)
KOL fokus	42.4	46.8	46.0	4.3 (3.4;5.3)	-0.7 (-1.6;0.2)	-5.1 (-6.6;-3.6)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-1.1 (-3.0;0.8)	-1.0 (-2.7;0.8)	0.4 (-1.5;2.2)	0.1 (-1.4;1.5)	1.3 (-0.2;2.9)	1.3 (-1.2;3.7)

Behandling af KOL (indløste recepter)

Prednisolonmængde \geq 250 mg årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	12.8	13.5	14.7	0.7 (-0.2;1.6)	1.2 (0.4;2.0)	0.5 (-0.9;1.9)
KOL fokus	14.6	15.1	15.8	0.5 (-0.2;1.2)	0.7 (-0.0;1.4)	0.2 (-1.0;1.4)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	1.8 (0.3;3.2)	1.6 (0.2;3.0)	1.1 (-0.2;2.5)	-0.2 (-1.3;1.0)	-0.5 (-1.6; 0.6)	-0.3 (-2.1;1.5)

Beta2-agonister [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	55.1	52.1	53.4	-2.9 (-4.2;-1.7)	1.3 (-0.1;2.7)	4.2 (2.1;6.3)
KOL fokus	56.0	54.0	54.4	-2.0 (-3.2;-0.8)	0.4 (-0.6;1.3)	2.3 (0.8;3.9)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	1.0 (-1.4;3.4)	1.9 (-0.1;3.9)	1.0 (-1.0;3.0)	0.9 (-0.8;2.7)	-0.9 (-2.6;0.8)	-1.9 (-4.4;0.7)

Anticholinergika [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	20.0	23.3	26.4	3.3 (2.3;4.3)	3.1 (2.2;3.9)	-0.2 (-1.7;1.2)
KOL fokus	19.8	23.2	26.7	3.4 (2.5;4.3)	3.5 (2.7;4.3)	0.1 (-1.1;1.3)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-0.2 (-2.1;1.6)	-0.1 (-1.9;1.6)	0.3 (-1.5;2.1)	0.1 (-1.2;1.4)	0.5 (-0.7;1.6)	0.4 (-1.6;2.3)

Methylxantiner [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	3.1	2.1	1.5	-1.0 (-1.4;-0.7)	-0.6 (-0.8;-0.4)	0.4 (0.1;0.8)
KOL fokus	2.7	1.9	1.3	-0.8 (-1.0;-0.6)	-0.5 (-0.7;-0.4)	0.3 (-0.0;0.5)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-0.4 (-1.1;0.2)	-0.2 (-0.6;0.2)	-0.2 (-0.5;0.2)	0.2 (-0.2;0.6)	0.0 (-0.2;0.3)	-0.2 (-0.7;0.3)

Inhalerede Glukokortikoider [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	38.2	33.2	29.6	-5.0 (-6.3;-3.8)	-3.5 (-4.7;-2.4)	1.5 (-0.3;3.4)
KOL fokus	39.6	34.7	31.0	-4.9 (-5.9;-4.0)	-3.7 (-4.7;-2.8)	1.2 (-0.2;2.6)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	1.4 (-1.7;4.5)	1.6 (-1.0;4.1)	1.4 (-1.1;3.8)	0.1 (-1.4;1.7)	-0.2 (-1.7;1.3)	-0.3 (-2.7;2.0)

Kombinationspræparater [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	47.0	49.0	48.9	2.0 (0.7;3.2)	-0.1 (-1.4;1.2)	-2.1 (-3.8;-0.3)
KOL fokus	45.4	48.2	48.0	2.8 (1.6;4.1)	-0.2 (-1.1;0.7)	-3.0 (-4.5;-1.5)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-1.7 (-4.6;1.2)	-0.8 (-3.3;1.7)	-0.9 (-3.3;1.5)	0.9 (-0.9;2.6)	-0.1 (-1.7;1.4)	-1.0 (-3.3;1.4)

Lægekøntakter almen praksis KOL

Årskontrol årligt (15 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	6.3	11.5	21.1	5.2 (3.5;6.9)	9.6 (7.0;12.2)	4.4 (1.2;7.5)
KOL fokus	9.1	15.8	33.7	6.7 (5.1;8.3)	17.9 (16.1;19.7)	11.2 (8.9;13.5)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	2.8 (0.6;5.0)	4.3 (1.0;7.5)	12.6 (8.1;17.0)	1.5 (-0.8;3.8)	8.3 (5.1;11.4)	6.8 (2.9;10.7)

Middelantal vagtlægekøntakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	435.3	369.9	275.4	-65.4 (-114.2;-16.7)	-94.4 (-119.2;-69.7)	-29.0 (-89.6;31.6)
KOL fokus	383.8	364.6	257.5	-19.2 (-41.9;3.5)	-107.1 (-129.7;-84.4)	-87.9 (-123.0;-52.8)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-51.5 (-109.0;5.9)	-5.3 (-37.2;26.6)	-17.9 (-43.7;7.8)	46.2 (-7.5;100.0)	-12.6 (-46.2;20.9)	-58.9 (-129.0;11.2)

Middelantal face-to-face-kontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	7171.4	7302.0	7741.6	130.6 (-67.3;328.5)	439.6 (227.8;651.4)	309.0 (-7.0;625.0)
KOL fokus	7126.1	7651.2	7984.0	525.2 (351.1;699.2)	332.8 (169.7;495.9)	-192.3 (-449.4;64.7)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-45.3 (-398.6;308.0)	349.2 (-9.4;707.8)	242.4 (-154.7;639.5)	394.5 (131.2;657.8)	-106.8 (-374.1;160.5)	-501.3 (-908.4;-94.2)

Lægekontakter sekundærsektor KOL

Indlæggelse årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	23.4	22.8	22.8	-0.6 (-1.6;0.4)	0.0 (-1.0;1.1)	0.6 (-1.2;2.4)
KOL fokus	22.1	22.3	22.0	0.2 (-0.6;1.0)	-0.3 (-1.2;0.7)	-0.5 (-2.0;1.0)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-1.3 (-2.5;-0.0)	-0.5 (-1.7;0.8)	-0.8 (-1.9;0.3)	0.8 (-0.5;2.1)	-0.3 (-1.7;1.1)	-1.1 (-3.4;1.3)

Indlæggelse for KOL årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	3.5	3.1	2.8	-0.4 (-0.8;0.1)	-0.3 (-0.8;0.1)	0.1 (-0.7;0.8)
KOL fokus	3.1	2.9	2.8	-0.2 (-0.5;0.2)	-0.1 (-0.4;0.2)	0.1 (-0.4;0.7)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-0.4 (-0.9;0.1)	-0.2 (-0.7;0.2)	0.0 (-0.4;0.4)	0.2 (-0.4;0.7)	0.2 (-0.3;0.8)	0.1 (-0.9;1.0)

Indlæggelse (respiratorisk) årligt (12 mdr) [%]						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	6.8	6.5	5.9	-0.4 (-0.9;0.2)	-0.6 (-1.2;-0.1)	-0.2 (-1.2;0.7)
KOL fokus	6.4	6.2	6.2	-0.2 (-0.7;0.3)	0.0 (-0.4;0.5)	0.2 (-0.5;1.0)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-0.4 (-1.1;0.2)	-0.3 (-0.9;0.3)	0.3 (-0.2;0.9)	0.2 (-0.6;0.9)	0.6 (-0.1;1.4)	0.5 (-0.8;1.7)

Middelantal ambulante kontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	3386.0	3663.6	4047.1	277.5 (102.6;452.4)	383.5 (206.2;560.7)	105.9 (-188.2;400.1)
KOL fokus	3278.0	3743.1	4019.1	465.1 (326.5;603.7)	276.0 (129.3;422.8)	-189.1 (-433.3;55.1)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-108.0 (-334.3;118.2)	79.5 (-141.6;300.7)	-28.0 (-276.5;220.6)	187.6 (-35.1;410.2)	-107.5 (-337.6;122.7)	-295.0 (-677.1;87.0)

Middelantal ambulante KOL-kontakter/1000 patienter (12 mdr)						
	2008	2010	2012	2010 vs. 2008	2012 vs. 2010	2010-12 vs. 2008-10
Ikke-deltagere	204.8	208.6	213.1	3.8 (-23.0;30.6)	4.5 (-28.0;37.0)	0.7 (-40.8;42.3)
KOL fokus	185.6	197.9	237.3	12.4 (-22.2;46.9)	39.4 (10.8;67.9)	27.0 (-26.3;80.3)
KOL fokus vs. ikke-deltagere	-19.3 (-75.8;37.2)	-10.7 (-52.0;30.6)	24.2 (-12.9;61.3)	8.6 (-35.0;52.2)	34.9 (-8.4;78.2)	26.3 (-41.3;93.8)

B:GRAFER

- Ikke-deltagere
- KOL fokus (Deltagere)
- Ikke-KOL fokus (Deltagere)







