

Projektets vision var at udvikle en metode til reduktion af overforbruget af benzodiazepiner og cyclopyrroloner i almen praksis. Metoden skulle være let, fagligt forsvarlig og indenfor gældende regler.

Formålet med dette studie er at formidle og evaluere den samlede viden om metodens konsekvenser. Herunder dokumentere de primære- og sekundære påvirkninger på ordinationsmønsteret af udvalgte lægemidler samt beskrive den sekundære påvirkningen af patienterne og sundhedsvæsenet.

Den overordnede målsætning involverer følgende specifikke mål:

- 1. At undersøge interventionens påvirkning på forbruget af BZ og CP i en mindre population over kortere og længere tid.*
- 2. At beskrive de sekundære konsekvenser for de to primære praksis, herunder belastning, patientflugt, tidsforbrug, økonomi og klagesager.*
- 3. At beskrive patienternes reaktionsmønster før, under og efter interventionen.*
- 4. At undersøge aldersfordelingen og interventionens indflydelse på ordinationsmønsteret i forskellige aldersgrupper.*
- 5. At undersøge interventionens påvirkning på ordinationen af BZ og CP i en større population.*
- 6. At undersøge interventionens påvirkning i en større population på arbejdsmængden for den praktiserende læge, hjemmeplejen, speciallæger samt det sekundære behandlesystem. Derudover at undersøge arten af abstinenssymptomer og sværhedsgraden.*
- 7. At undersøge langtidseffekten på forbruget af antidepressiva (N06A) i en population under interventionen mod BZ og CP.*

8. *At undersøge langtidseffekten på forbruget af antipsykotika (N05A) i en population under interventionen mod BZ og CP.*
9. *At undersøge effekten på forbruget af antidepressiva (N06A) i en større population under interventionen mod BZ og CP.*
10. *At undersøge effekten på forbruget af antidepsykotika (N05A) i en større population under interventionen mod BZ og CP.*