

COVID-19 Vaccination med Pfizer/BioNTech eller Moderna

Tjekliste til vaccinatør

Indledende spørgsmål:

1. Har du haft COVID-19 inden for de sidste fire uger?

- Hvis ja: vaccination kan tidligst ske 1 måned efter overstået sygdom

2. Afventer du lige nu svar fra en COVID-19 test?

- Hvis ja: Hvis testen er på baggrund af symptomer: afvent testsvar - ved positivt testsvar kan vaccination tidligst ske 1 måned efter.
- Hvis testen er på baggrund af nærkontakt: afvent testsvar fra dag 6 eller senere - ved positivt testsvar kan vaccination tidligst ske 1 måned efter.
- Hvis testen er af anden årsag, og der ikke er symptomer eller nærkontakt: borgeren kan vaccineres straks.

3. Har du feber eller andre tegn på sygdom lige nu?

- Ved temp > 38,0: vaccinationen skal udskydes.

4. Er du allergisk overfor nogle lægemidler?

- Hvis borgeren har oplevet anafylaktisk straksreaktion ved af lægemiddel eller tidligere vaccination, skal borgeren henvende sig til egen læge, som kan konferere med allergi-center og evt. arrangere vaccination på hospital.

5. Har du sygdommen mastocytose?

- Hvis ja: borgeren skal kontakte egen læge, som kan konferere med allergi-center.

6. Har du thrombocytopeni, koagulationsforstyrrelse fx blødersygdom?

- Hvis ja: borgeren skal kontakte hæmofili-centret mhp evt. forebyggende blødermedicin.

7. Har du immundefekt eller er i immunsupprimerende behandling?

- Hvis ja: borgeren kan vaccineres, men effekten kan være nedsat.

8. Er du gravid, ammende eller planlægger graviditet inden for de næste 2 måneder?

- Hvis ja: vent med vaccination og tal med egen læge.

Oplys om:

- Vaccinationen er frivillig
- Der kan forekomme bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger: ømhed ved indstiksstedet, træthed, hovedpine, muskelsmerter
- Ved alvorligere bivirkninger i form af vejrtrækningsbesvær eller hududslet skal egen læge kontaktes

✓ **Sikr dig samtykke til vaccinationen**

✓ **Pjece fra sst udleveres!**